

Fiche Conseil - Injection d'acide hyaluronique

Les produits de comblement sont des injectables biodégradables à base d'acide hyaluronique réticulé d'origine non animale et pour certains de lidocaïne, (anesthésiant visant à diminuer les douleurs) utilisés dans les traitements esthétiques du visage tels que la correction des rides, l'augmentation du volume des lèvres et la correction des contours. Le choix du type d'acide hyaluronique par votre médecin dépend de l'épaisseur de la peau, de la profondeur de la ride, de l'existence ou non d'une perte de volume au niveau des pommettes et des joues notamment.

Résultat

Le traitement se maintient 12 mois en général et entre 12 à 18 mois quand on utilise un acide hyaluronique volumateur pour la zone des pommettes ou des joues. Ces durées sont données à titre indicatif et varie en fonction du type de peau, de l'hygiène de vie (tabac, exposition solaire...). Une séance annuelle est recommandée pour l'entretien du résultat.

Effets indésirables

Il existe des effets secondaires potentiels liés à l'injection du gel d'acide hyaluronique survenant immédiatement ou de façon retardée. Parmi ceux-ci :

- Douleur à l'injection, rougeur, œdèmes, démangeaisons, ecchymose aux points d'injection. Ces réactions peuvent disparaître entre 48H et 8 jours. Un maquillage correcteur de teint est tout à fait possible
- De rares cas de coloration ou de dépigmentation de la zone injectée ont été rapportés.

Toute réaction anormale est à signaler à votre médecin dans les plus brefs délais

Information sur les risques potentiels

Des infections, des hématomes, indurations ou nodules peuvent apparaître au point d'injection. De rares cas de nécroses dans la région de la glabelle, d'abcès, de granulomes d'hypersensibilité ont été rapportés après des injections d'acide hyaluronique et/ou de lidocaïne.

Précautions pré et post injections

La prise d'aspirine et de vitamine C à dose élevée est à éviter la semaine précédant l'injection.

Éviter l'exposition prolongée au soleil, aux UV, aux températures inférieures à 0°C, ainsi que la pratique du sauna ou hammam pendant les deux semaines suivant l'injection.

Éviter de frotter ou masser les zones traitées pendant les 24 heures suivant le traitement.

Éviter de se maquiller durant les 12 heures suivant le traitement.

- **Contre Indications** : *Il est important de signaler à votre médecin vos antécédents médicaux et esthétiques ainsi que toutes les prises médicamenteuses.*
- Grossesse et allaitement
- Allergie à l'acide hyaluronique ou aux anesthésiques locaux
- Des précautions d'emploi ou contre indications seront observées en cas :
 - de maladies auto-immunes (la contre-indication est formelle en cas de maladie évolutive et/ou non traitée), de traitement immuno-suppresseur
 - d'inflammation ou d'infection évolutive aux points d'injection (acné, herpes...)
 - antécédents d'injection de produits d'injection **non résorbables**
 - de patients ayant tendance à développer des cicatrices hypertrophiques
 - pas d'utilisation en association IMMEDIATE avec un traitement laser, peeling profond ou dermabrasion.